

ERRATUM ET ADDENDUM
A MA RÉCENTE NOTE SUR LES CRASSICAUDA
(NEMATODA SPIRURATA) ¹

Par R. PH. DOLLFUS

Erratum

Page 875 : la ligne 23 doit être corrigée ; lire « les œufs mesurent 50×34 (au lieu de $50 \times 30 \mu$ chez *giliakiana*) ».

Addendum

Page 868 : le tableau n'indique qu'une seule référence de *Crassicauda* chez *Tursiops*. Depuis l'impression de ce tableau, j'ai examiné des fragments d'un *Crassicauda* ♀ d'un *Tursiops tursio* (Fabricius) du Déroit de Gibraltar (11-3-1966) qui m'ont été aimablement remis par le D^r Henri ALONCLE (Institut des Pêches Maritimes, Casablanca). Lors de la dissection de ce *Tursiops*, une masse, grosse comme le poing, de *Crassicauda* enchevêtrés fut trouvée fixée au crâne, sous l'obite droite. La paroi osseuse était fortement détériorée et présentait une structure spongieuse dont les cavités étaient occupées par le parasite. Ce matériel, lorsqu'il m'a été remis, était desséché et son étude anatomique n'a pas été possible ; néanmoins, j'ai pu mesurer les œufs : $45 \times 32 \mu$; coque épaisse de $5,3 \mu$. Ces dimensions sont les mêmes que celles mentionnées par moi p. 874 pour un *Crassicauda* de *Mesoplodon* qui a été considéré par A. G. CHABAUD comme *C. anthonyi* A. G. Chabaud 1963.

1. R. Ph. DOLLFUS. Connait-on plusieurs espèces de *Crassicauda* (Nematoda Spirurata) chez les Cétacés Ziphiinae ? *Bull. Mus. Hist. nat.*, 2^e sér., **37**, n^o 5, 1965 (1966), pp. 865-878, fig. 1-4.